

SEN1500

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS DATOS DE MORBIMORTALIDAD 2006

*Moro M., Figueras J., Fernández C., Doménech E., Guzmán
J., Jiménez R., Pérez J., Pérez-Sheriff V., Quero J., Roqués
V., y Grupo SEN1500*



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA

Septiembre 2007

1. Centros participantes y colaboradores. Coordinadores.	4
<i>Tabla 0. Servicios y/o Unidades de Neonatología (UN) y niños incluidos en la SEN1500 (N=63) por Comunidad Autónoma. Año 2006.</i>	10
2. Metodología.	11
3. Análisis de resultados de los datos de morbimortalidad 2006 por intervalos de peso y edad gestacional.	13
<i>Tabla 1a. Características Perinatales en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de peso)</i>	14
<i>Tabla 1b. Características Perinatales en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de edad gestacional)</i>	15
<i>Tabla 2a. Apgar e intervenciones terapéuticas en la sala de partos en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de peso)</i>	16
<i>Tabla 2b. Apgar e intervenciones terapéuticas en la sala de partos en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de edad gestacional)</i>	17
<i>Tabla 3a. Intervenciones respiratorias y morbilidad en recién nacidos con peso < 1500g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de peso)</i>	18
<i>Tabla 3b. Intervenciones respiratorias y morbilidad en recién nacidos con peso < 1500g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de edad gestacional)</i>	19
<i>Tabla 4a. Tiempo mediano (RIQ) en minutos hasta la primera dosis de surfactante según lugar de nacimiento y global, en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de peso)</i>	20
<i>Tabla 4b. Tiempo mediano (RIQ) en minutos hasta la primera dosis de surfactante según lugar de nacimiento y global, en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de edad gestacional)</i>	21
<i>Tabla 5a. Situación en la sala de partos, 28 días, 36 semanas postconcepcionales y al alta. Recién nacidos <1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de peso)</i>	22
<i>Tabla 5b. Situación en la sala de partos, 28 días, 36 semanas postconcepcionales y al alta. Recién nacidos <1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de edad gestacional)</i>	23
<i>Tabla 6a. Otros resultados e intervenciones en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ</i>	24

(por categorías de peso)

Tabla 6b. Otros resultados e intervenciones en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de edad gestacional)	25
Tabla 7a. Otros resultados e intervenciones en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de peso)	26
Tabla 7b. Otros resultados e intervenciones en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (%) RIQ (por categorías de edad gestacional)	27
Tabla 8a. Duración de la estancia media en días (DE) en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de peso)	28
Tabla 8b. Duración de la estancia media en días (DE) en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de edad gestacional)	29
Tabla 9a. Duración de la estancia mediana en días (RIQ) en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de peso)	30
Tabla 9b. Duración de la estancia mediana en días (RIQ) en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de edad gestacional)	31
Tabla 10a. Peso medio en gramos (DE) al alta en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de peso)	32
Tabla 11b. Peso medio en gramos (DE) al alta en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de edad gestacional)	33
Tabla 11a. Peso mediano en gramos (RIQ) al alta en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de peso)	34
Tabla 11b. Peso mediano en gramos (RIQ) al alta en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por categorías de edad gestacional)	35
Tabla 12a. Fallecimientos en recién nacidos con peso < 1500 g, por intervalos de peso (100g) SEN 1500, año 2006.	36
Tabla 12b. Fallecimientos en recién nacidos con peso < 1500 g, por intervalos de edad gestacional (semanas). SEN 1500, año 2006.	37
Tabla 13. Morbilidad en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN 1500, año 2006. (por intervalos de peso 100g)	38

1. Centros participantes y colaboradores. Coordinadores.

Centros participantes y colaboradores:

Compl. Hosp. Albacete (Albacete)

Dr. Andrés Martínez Gutiérrez

H.G U. Alicante (Alicante)

Dra. Manuela López Azorín

H. U. San Juan (Alicante)

Dr. Javier Gonzalez de Dios

H. Elche (Alicante)

Dr. Fernando Vargas / Dr. Josep Mut Buigues

H. Vega Baja (Alicante)

Dr. José Pastor Rosado

H. Ntra. Sra. De Sonsoles (Ávila)

Dr. Antonio Martín Sanz / Dr. Manuel Marrero

H. Clínic Barcelona (Barcelona)

Dr. Josep Figueras Aloy

Corporació Parc Taulí (Barcelona)

Dr. Juan Badía Barnusell

H. de la Creu i Sant Pau (Barcelona)

Dra. Gemma Ginovart Galiana

I. Dexeus (Barcelona)

Dra. Roser Porta

H. German Trias i Pujol (Barcelona)

Dr. W Coroleu

H. de Granollers (Barcelona)

Dr. Israel Anquela Sanz

H. Mutua de Terrassa (Barcelona)

Dr. Ángel Moral García

H. San Joan de Deu (Barcelona)

Dr. Martín Iriondo Sanz

Scias-H. Barcelona (Barcelona)

Dr. Xavier Sagrera Felip / Dra. Silvia Martínez

H. Vall d'Hebrón (Barcelona)

Dra. Anna Fina Martí / Dr. Josep Perapoch López

H. Basurto (Bilbao)

Dr. Gabriel Saitua Iturriaga

H. Cruces (Bilbao)

Dra. Carolina de Castro Laíz

H.G. Yagüe (Burgos)

Dr. Bruno Alonso Álvarez

H. San Pedro de Alcántara (Cáceres)

Dra. María Jesús López Cuesta / Dra. Ana Raquel Barrio Sacristán/ Dr. Valentín Carretero Diaz

H. Jerez (Cádiz)

Dr. J. Ortiz Tardío / Dra. Eugenia Valls Sánchez Puerta

H. General de Castellón (Castellón)

Dr. Ramón Aguilera Olmos

H. de Alarcos (Ciudad Real)

Dr. Miguel Ángel García Cabezas

H. Infanta Margarita (Córdoba)

Dr. José M^a Barcia Ruiz

H. Reina Sofía (Córdoba)

Dra. Juana M^a Guzmán Cabañas

H. Cabueñes (Gijón)

Dra. Adela Rodríguez Fernández

H. U. de Girona (Girona)

Dr. Lluís Mayol Canals

H. Virgen de las Nieves (Granada)

Dr. Rafael Robles Ceres / Dr. Luis Moltó

H. M. I. Las Palmas (Las Palmas. Gran Canaria)

Dr. Fermín García-Muñoz

H. Juan Ramón Jiménez (Huelva)

Dr. José Ángel Morilla Sánchez

H. Bierzo (León)

Dra. M^a Teresa González Martínez

H. León (León)

Dr. Emilio Álvaro Iglesias

H. San Millán San Pedro (Logroño)

Dr. Fermín Cucalón Manzanos

H.U. Aranau de Vilanova (Lleida)

Dr. Eduard Soler Mir

H. Clínico San Carlos (Madrid)

Dra. Eulalia Mariscal Ramos

Fundación H. Alcorcón (Madrid)

Dra. Ana Martín Ancel / Dr. Martínez Horgado

H. Getafe (Madrid)

Dra. Marta Muro / Dra. Cabanillas

H.G.U. Gregorio Marañón (Madrid)

Dra. Amparo Rodríguez Herreras

H.I. La Paz (Madrid)

Dr. Jesús Pérez Rodríguez / Dra. Sofía Salas

H. Montepíncipe (Madrid)

Dra. Marta García San Miguel

H. Severo Ochoa (Madrid)

Dra. María José Santos Muñoz

H. de la Zarzuela (Madrid)

Dra. Marisa López

H. Carlos Haya (Málaga)

Dr. Tomás Sánchez Tamayo / Dr. Manuel García del Río / Dr. Vicente Parra

H. Central de Asturias (Oviedo)

Dr. José López Sastre

H. Son Dureta (Palma de Mallorca)

Dr. Catalina Isabel Cervera

H.U. Salamanca (Salamanca)

Dra. Pilar García González

H. Donostia (San Sebastián)

Dr. Luis Paisán Grisolia

H. Cantabria (Santander)

Dr. Javier Gómez-Ullate Vergara

H.C.U. Santiago (Santiago de Compostela)

Dr. José M^a Fraga / Dra. M^a Isabel Martínez Soto

H. G. Segovia (Segovia)

Dra. Miryam Hortelano / Dr. Alfonso Urbon

H. Virgen de la Macarena (Sevilla)

Dra. Mercedes Granero Asensio

H.U.I. Virgen del Rocío (Sevilla)

Dra. Carmen Macías Díaz

H. Juan XXIII (Tarragona)

Dr. Juan Manuel Carretero Bellón

H.U. Canarias (Tenerife)

Dr. Pedro Amadeo Fuster Jorge

H. Virgen de la Salud (Toledo)

Dra. Alicia de Ureta Huertas / Dr. Antonio Arroyos Plana

H.U. La Fe (Valencia)

Dr. Vicente Roqués

H.C.U. de Valencia (Valencia)

Dr. Javier Estañ Capell

H.U. Valladolid (Valladolid)

Dr. José Luis Fernández Calvo

H.U. Río Hortega (Valladolid)

Dra. Carmen González Armengol / Dra. M^a J. Soga García

H. Xeral Vigo (Vigo)

Dra. Socorro Ocampo Cardalda

H. Txagorritxu (Vitoria)

Dra. María Mercedes Martínez Ayucar

H. Miguel Servet (Zaragoza)

Dr. Jose Julian Beltrán Crusells

H. Virgen de la Concha (Zamora)

Dra. Trinidad Casanueva / Dr. Víctor Marugan

Comisión SEN1500:

Coordinación científica:

1. Dr. Manuel Moro. Hospital Clínico San Carlos (Madrid). Presidente.
2. Dr. Josep Figueras Aloy. Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona). Vicepresidente.
3. Dr. Eduardo Doménech. Hospital Universitario de Canarias (Tenerife).
4. Dra. Juana M^a Guzmán Cabañas. Hospital Reina Sofía (Córdoba).
5. Dr. Rafael Jiménez. Hospital San Joan de Deu (Barcelona).
6. Dr. Jesús Pérez Rodríguez. Hospital Materno-Infantil La Paz (Madrid).
7. Dr. Vicente Pérez Sheriff. Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid).
8. Dr. José Quero. Hospital Materno-Infantil La Paz (Madrid).
9. Dr. Vicente Roqués. Hospital Clínico-Infantil La Fe (Valencia).

Coordinación epidemiológica:

10. Dra. Cristina Fernández Pérez. Unidad de Apoyo a la Investigación. Hospital Clínico San Carlos (Madrid).

Coordinación informática:

11. Pablo Díaz. INFORMANCE S.L. (Valencia).



Nº DE CENTROS = 63
SEN1500

Tabla 0. Servicios y/o Unidades de Neonatología (UN) y niños incluidos en la SEN 1500 (N=63) por Comunidad Autónoma. Año 2006.

	Unidades neonatales		Niños ingresados	
	N	%	N	%
<i>Andalucía</i>	8	12,70	535	21,37
<i>Aragón</i>	1	1,59		
<i>Asturias</i>	2	3,17	65	2,60
<i>Baleares</i>	1	1,59		
<i>C. Valenciana</i>	7	11,11	335	13,38
<i>Canarias</i>	2	3,17	140	5,59
<i>Cantabria</i>	1	1,59	35	1,40
<i>Castilla la Mancha</i>	3	4,76	105	4,19
<i>Castilla y León</i>	9	14,29	136	5,43
<i>Cataluña</i>	13	20,63	477	19,05
<i>Extremadura</i>	1	1,59	33	1,32
<i>Galicia</i>	2	3,17	20	0,80
<i>La Rioja</i>	1	1,59	13	0,52
<i>Madrid</i>	8	12,70	434	17,33
<i>País Vasco</i>	4	6,35	176	7,03

2. Metodología.

Toda la información recogida en este informe procede de la base de datos SEN1500 cerrada el **15 de julio de 2007**.

En las tablas del **Análisis de resultados de los datos de morbimortalidad 2006**, las variables cualitativas se expresan con sus números absolutos y sus porcentajes globales y por cada grupo de peso (tablas tipo a) y por cada grupo de edad gestacional (tablas tipo b). Los datos cuantitativos se resumen en su media y desviación estándar (DE) o mediana y RIQ. El percentil 25 indica que el 25% de los centros tienen un valor igual o inferior a dicho percentil en la característica a estudio (ej: si el percentil 25 de la estancia es 41 días, significa que el 25% de los niños están ingresados 41 días o menos).

Los intervalos de peso de 250 g. se escogieron por ser los más utilizados en las bases de datos internacionales, con el fin de facilitar la comparabilidad de este estudio con otros.

Las frecuencias de cada variable pueden compararse con las del informe global, observando si el porcentaje de la característica que corresponda en ese hospital está incluido dentro del RIQ del informe global (ej: en un hospital el 9,3% de los neonatos tienen infección tardía, el RIQ del informe global es 0,0-7,5 (P25-P75), lo cual quiere decir que ese hospital tiene un porcentaje de infección tardía superior al valor obtenido por el 75% de los hospitales estudiados. El rango intercuartílico comprende el 50% de la muestra).

En las **tablas 3** (morbilidad y soporte respiratorio), **6 (a y b)** y **7 (a y b)** (otros resultados e intervenciones), **8 (a y b)** y **9 (a y b)** (estancias), el porcentaje, la media y la mediana se calculan sobre los niños ingresados en la Unidad Neonatal, es decir, eliminando aquellos que fallecieron en la sala de partos. Las tablas **12 (a y b)** representan la mortalidad por intervalos de 100 g. de peso y edad gestacional en semanas, respectivamente. La **tabla 13** representa la morbilidad por intervalos de 100 g. de peso, con el número de niños que presentan la característica a estudio y el porcentaje asociado.

***3. Resultados de morbimortalidad.
Análisis preliminar de los datos de 2006.***

Tabla 1a. Características Perinatales en recién nacidos con peso <1500g. SEN1500, año 2006. % (RIQ)

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2504)	< 501 (N=36)	501-750 (N=271)	751-1000 (N=573)	1001-1250 (N=667)	1251-1500 (N=957)
Nacidos en Hospital	92.2 (90.0-100.0)	86.1 (80.0-100.0)	93.4 (92.5-100.0)	91.3 (91.1-100.0)	91.3 (88.2-100.0)	93.4 (87.6-100.0)
Hombres	52.3 (43.6-58.9)	38.9 (0.0-61.7)	49.8 (20.0-75.0)	54.5 (42.6-74.4)	51.7 (40.0-66.7)	52.6 (44.5-61.5)
Bajo peso en <30 semanas*	11.5 (0.0-14.3)	66.7 (50.0-100.0)	26.3 (11.9-50.0)	14.7 (0.0-18.4)	5.2 (0.0-7.1)	-
Esteroides antenatales						
Completos	58.3 (50.0-69.3)	38.2 (0.0-100.0)	46.2 (0.0-58.4)	60.1 (45.2-76.9)	63.8 (50.0-80.0)	57.6 (47.0-81.2)
Parciales	22.0 (7.1-28.7)	32.4 (0.0-54.2)	28.2 (0.0-37.5)	22.7 (0.0-36.4)	21.6 (0.0-30.6)	19.6 (0.0-28.6)
No esteroides	19.7 (11.1-29.3)	29.4 (0.0-66.7)	25.6 (0.0-52.5)	17.2 (0.0-25.0)	14.6 (0.0-25.0)	22.8 (0.0-30.9)
Cesárea	66.5 (59.7-74.1)	41.7 (0.0-62.5)	51.7 (25.0-75.5)	64.6 (51.0-96.0)	69.6 (50.0-80.0)	70.6 (63.6-91.7)
Nacimiento múltiple	33.5 (20.8-43.8)	50.0 (0.0-100.0)	29.9 (0.0-42.9)	25.7 (0.0-38.5)	33.7 (19.4-54.5)	38.3 (27.0-48.8)
Malformación congénita	7.2 (0.0-9.1)	2.8 (0.0-0.0)	4.5 (0.0-0.0)	7.9 (0.0-10.8)	7.2 (0.0-8.1)	7.7 (0.0-11.1)
	N=179	N=1	N=12	N=45	N=48	N=73
SNC	6.7 (0.0-0.0)	-	8.3 (0.0-0.0)	2.2 (0.0-0.0)	8.3 (0.0-0.0)	8.2 (0.0-0.0)
Corazón	41.9 (0.0-69.4)	100.0 (100.0-100.0)	41.7 (0.0-75.0)	48.9 (0.0-100.0)	43.8 (0.0-87.5)	35.6 (0.0-63.3)
Ap. digestivo	15.6 (0.0-33.3)	-	7.7 (0.0-0.0)	17.8 (0.0-18.1)	20.8 (0.0-50.0)	12.3 (0.0-20.0)
Ap. genitourinario	13.4 (0.0-29.2)	-	16.7 (0.0-50.0)	13.3 (0.0-9.4)	14.6 (0.0-23.2)	12.3 (0.0-20.0)
Cromosómicas	5.0 (0.0-0.0)	-	-	4.4 (0.0-0.0)	6.3 (0.0-0.0)	5.5 (0.0-0.0)
Pulmonares	2.8 (0.0-0.0)	-	16.7 (0.0-25.0)	4.4 (0.0-0.0)	-	1.4 (0.0-0.0)
Linfáticas	6.7 (0.0-0.0)	-	8.3 (0.0-0.0)	4.4 (0.0-0.0)	6.3 (0.0-0.0)	8.2 (0.0-0.0)
Vasculares	3.9 (0.0-0.0)	-	8.3 (0.0-0.0)	4.4 (0.0-0.0)	2.1 (0.0-0.0)	4.1 (0.0-0.0)
Letales	12.3 (0.0-15.6)	-	16.7 (0.0-25.0)	6.7 (0.0-0.0)	12.5 (0.0-3.6)	15.1 (0.0-22.5)
Otras						

*Bajo peso para edad gestacional en < de 30 semanas de gestación según el Percentil 10 de las tablas de Alexander

Tabla 1b. Características Perinatales en recién nacidos con peso <1500g. SEN1500, año 2006. % (RIQ)

	Edad gestacional al nacimiento en semanas					
	Total (N=2504)	≤23 (N=51)	24-25 (N=245)	26-27 (N=423)	28-29 (N=613)	≥30 (N=1172)
Nacidos en Hospital	92.2 (90.0-100.0)	96.1 (100.0-100.0)	88.9 (85.7-100.0)	89.8 (86.2-100.0)	90.5 (89.1-100.0)	94.5 (91.7-100.0)
Hombres	52.3 (43.6-58.9)	52.9 (0.0-100.0)	54.7 (30.0-100.0)	55.3 (48.4-74.4)	55.1 (40.8-66.7)	49.1 (38.9-59.6)
Bajo peso en <30 semanas*	11.5 (0.0-14.3)	9.8 (0.0-0.0)	4.5 (0.0-0.0)	6.6 (0.0-9.3)	11.7 (0.0-16.7)	22.7 (11.8-32.6)
Esteroides antenatales						
Completos	58.3 (50.0-69.3)	12.0 (0.0-0.0)	46.2 (0.0-66.7)	55.3 (36.4-72.7)	59.7 (40.0-71.4)	63.4 (53.6-87.1)
Parciales	22.0 (7.1-28.7)	32.0 (0.0-62.5)	29.2 (0.0-50.0)	26.7 (0.0-40.0)	25.0 (6.5-33.3)	16.6 (5.1-22.9)
No esteroides	19.7 (11.1-29.3)	56.0 (0.0-100.0)	24.6 (0.0-50.0)	18.1 (0.0-28.6)	15.2 (0.0-24.8)	20.0 (0.0-27.5)
Cesárea	66.5 (59.7-74.1)	7.8 (0.0-0.0)	31.4 (0.0-50.0)	57.9 (35.5-83.0)	67.2 (50.0-73.9)	79.1 (73.5-99.0)
Nacimiento múltiple	33.5 (20.8-43.8)	39.2 (0.0-100.0)	32.7 (0.0-50.0)	24.6 (0.0-33.3)	32.3 (14.6-43.1)	37.2 (27.5-46.8)
Malformación congénita	7.2 (0.0-9.1)	2.0 (0.0-0.0)	3.7 (0.0-0.0)	6.1 (0.0-8.6)	6.4 (0.0-9.0)	8.9 (0.0-12.5)
	N=179	N=1	N=9	N=26	N=39	N=104
SNC	6.7 (0.0-0.0)	-	-	3.8 (0.0-0.0)	2.6 (0.0-0.0)	9.6 (0.0-0.0)
Corazón	41.9 (0.0-69.4)	-	77.8 (62.5-100.0)	53.8 (0.0-100.0)	48.7 (0.0-100.0)	33.7 (0.0-61.1)
Ap. digestivo	15.6 (0.0-33.3)	-	22.2 (0.0-37.5)	19.2 (0.0-50.0)	7.7 (0.0-0.0)	17.1 (0.0-41.7)
Ap. genitourinario	13.4 (0.0-29.2)	100.0 (100.0-100.0)	11.1 (0.0-8.3)	11.5 (0.0-0.0)	12.8 (0.0-20.0)	13.5 (0.0-20.2)
Cromosómicas	5.0 (0.0-0.0)	-	-	3.8 (0.0-0.0)	2.6 (0.0-0.0)	6.7 (0.0-0.0)
Pulmonares	2.8 (0.0-0.0)	-	-	7.7 (0.0-0.0)	2.6 (0.0-0.0)	1.9 (0.0-0.0)
Linfáticas	6.7 (0.0-0.0)	-	-	3.8 (0.0-0.0)	12.8 (0.0-0.0)	5.8 (0.0-0.0)
Vasculares	3.9 (0.0-0.0)	-	-	3.8 (0.0-0.0)	10.3 (0.0-6.3)	1.9 (0.0-0.0)
Letales	12.3 (0.0-15.6)	-	-	15.4 (0.0-25.0)	5.1 (0.0-0.0)	15.4 (0.0-15.3)

*Bajo peso para edad gestacional en < de 30 semanas de gestación según el Percentil 10 de las tablas de Alexander

Tabla 2a. Apgar e intervenciones terapéuticas en la sala de partos en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006. % (RIQ)

		Peso al nacimiento en gramos					
		Total (N=2504)	< 501 (N=36)	501-750 (N=271)	751-1000 (N=573)	1001-1250 (N=667)	1251-1500 (N=957)
Apgar							
1 min.	<4	12.7 (3.4-18.7)	46.9 (0.0-76.3)	30.3 (0.0-50.0)	15.7 (0.0-25.0)	10.0 (0.0-16.7)	6.9 (0.0-8.9)
	4-6	31.2 (20.3-40.0)	34.4 (0.0-100.0)	44.7 (18.8-50.0)	44.1 (18.2-60.7)	28.5 (11.9-42.9)	21.7 (11.1-29.3)
	>6	56.0 (46.4-64.5)	18.8 (0.0-62.5)	25.0 (7.5-47.1)	40.2 (25.0-54.5)	61.5 (50.0-80.0)	71.3 (62.8-84.0)
5 min.	<4	3.1 (0.0-4.3)	31.3 (0.0-50.0)	10.7 (0.0-16.0)	3.3 (0.0-0.0)	1.2 (0.0-0.0)	1.2 (0.0-0.0)
	4-6	10.0 (2.4-13.3)	18.8 (0.0-37.5)	24.5 (0.0-42.5)	13.4 (0.0-20.0)	7.4 (0.0-11.9)	5.5 (0.0-7.8)
	>6	87.0 (80.5-95.2)	50.0 (0.0-100.0)	64.8 (39.6-100.0)	83.4 (75.0-100.0)	91.3 (87.4-100.0)	93.4 (89.0-100.0)
Intervenciones							
Oxígeno en sala de partos		68.6 (56.2-87.2)	52.8 (38.3-100.0)	86.3 (80.0-100.0)	79.5 (75.0-100.0)	68.0 (50.0-90.3)	58.1 (44.4-78.6)
Ambú		50.2 (36.5-61.7)	41.7 (0.0-100.0)	68.4 (42.1-100.0)	62.0 (42.5-83.4)	50.7 (28.6-64.3)	38.1 (21.4-50.0)
Intubación endotraqueal		33.6 (20.7-42.3)	47.2 (25.0-100.0)	75.6 (50.0-100.0)	54.0 (32.8-75.0)	28.5 (13.3-34.3)	12.5 (0.0-19.0)
Masaje cardiaco externo		4.6 (0.0-8.0)	-	10.3 (0.0-13.6)	6.7 (0.0-11.3)	3.6 (0.0-4.8)	2.5 (0.0-2.9)
Adrenalina		2.8 (0.0-4.1)	-	8.1 (0.0-14.3)	3.9 (0.0-7.7)	2.1 (0.0-0.0)	1.2 (0.0-0.0)
Surfactante		8.0 (0.0-8.8)	22.9 (0.0-70.0)	15.5 (0.0-30.0)	13.7 (0.0-18.2)	6.6 (0.0-0.9)	2.9 (0.0-1.6)
Nada		27.8 (11.8-37.2)	44.4 (0.0-61.7)	8.9 (0.0-13.6)	14.4 (0.0-20.0)	28.9 (8.3-50.0)	39.9 (21.4-52.9)

Tabla 2b. Apgar e intervenciones terapéuticas en la sala de partos en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006. % (RIQ)

		Edad gestacional al nacimiento en semanas					
		Total (N=2504)	≤23 (N=51)	24-25 (N=245)	26-27 (N=423)	28-29 (N=613)	≥30 (N=1172)
Apgar							
1 min.	<4	12.7 (3.4-18.7)	52.2 (0.0-100.0)	29.5 (0.0-50.0)	20.7 (0.0-42.9)	11.3 (0.0-17.4)	5.7 (0.0-10.3)
	4-6	31.2 (20.3-40.0)	34.8 (0.0-100.0)	47.4 (12.5-57.9)	44.8 (22.2-52.9)	33.4 (20.0-47.0)	21.9 (12.1-25.5)
	>6	56.0 (46.4-64.5)	13.0 (0.0-15.0)	23.1 (0.0-40.0)	34.5 (10.0-50.0)	55.3 (47.5-69.5)	72.3 (63.9-81.8)
5 min.	<4	3.1 (0.0-4.3)	34.8 (0.0-57.5)	8.7 (0.0-14.3)	3.6 (0.0-0.0)	1.2 (0.0-0.0)	1.5 (0.0-1.1)
	4-6	10.0 (2.4-13.3)	21.7 (0.0-50.0)	24.3 (0.0-38.8)	16.3 (0.0-28.6)	10.3 (0.0-14.2)	4.3 (0.0-7.7)
	>6	87.0 (80.5-95.2)	43.5 (0.0-100.0)	67.0 (46.4-100.0)	80.0 (63.6-100.0)	88.5 (83.8-100.0)	94.2 (90.6-100.0)
Intervenciones							
Oxígeno en sala de partos		68.6 (56.2-87.2)	51.0 (27.1-100.0)	85.7 (85.7-100.0)	84.5 (83.3-100.0)	75.7 (66.7-98.2)	56.5 (38.4-79.2)
Ambú		50.2 (36.5-61.7)	37.3 (0.0-100.0)	67.1 (50.0-100.0)	69.5 (49.2-100.0)	57.0 (40.7-72.4)	36.9 (20.0-45.8)
Intubación endotraqueal		33.6 (20.7-42.3)	49.0 (17.0-100.0)	75.0 (69.6-100.0)	67.5 (50.0-100.0)	37.4 (20.8-55.5)	10.2 (0.0-16.6)
Masaje cardiaco externo		4.6 (0.0-8.0)	2.0 (0.0-0.0)	11.1 (0.0-16.7)	7.4 (0.0-14.9)	4.9 (0.0-9.4)	2.1 (0.0-1.1)
Adrenalina		2.8 (0.0-4.1)	-	7.0 (0.0-13.0)	5.7 (0.0-7.6)	2.8 (0.0-1.6)	0.9 (0.0-0.0)
Surfactante		8.0 (0.0-8.8)	10.0 (0.0-5.0)	15.2 (0.0-40.0)	20.0 (0.0-22.2)	8.9 (0.0-11.1)	1.7 (0.0-0.0)
Nada		27.8 (11.8-37.2)	45.1 (0.0-72.9)	9.4 (0.0-12.5)	9.1 (0.0-13.4)	21.0 (0.0-27.8)	41.2 (19.1-60.0)

Tabla 3a. Intervenciones respiratorias y morbilidad en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006. % (RIQ)

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2466)	< 501 (N=24)	501-750 (N=261)	751-1000 (N=565)	1001-1250 (N=661)	1251-1500 (N=955)
Soporte respiratorio						
Oxígeno (sólo)	6.0 (0.0-9.4)	-	1.5 (0.0-0.0)	3.4 (0.0-0.0)	4.4 (0.0-6.3)	10.0 (0.0-16.4)
CPAP (sin ventilación convencional)	20.3 (6.1-29.3)	4.2 (0.0-0.0)	3.5 (0.0-0.0)	13.2 (0.0-16.7)	25.0 (9.1-35.5)	26.3 (8.3-40.0)
Ventilación convencional (Vc)	40.2 (29.2-56.3)	33.3 (0.0-100.0)	52.3 (26.7-100.0)	54.1 (38.5-79.6)	44.6 (33.3-66.7)	25.8 (11.6-41.0)
Ventilación alta REC. (VAFO)	0.3 (0.0-0.0)	-	-	0.4 (0.0-0.0)	0.5 (0.0-0.0)	0.2 (0.0-0.0)
Vc + VAFO	14.6 (0.0-18.4)	62.5 (0.0-100.0)	40.9 (0.0-59.4)	23.3 (0.0-33.3)	9.9 (0.0-12.5)	4.2 (0.0-5.8)
Ninguno	18.3 (6.5-23.3)	-	1.5 (0.0-0.0)	5.5 (0.0-7.9)	15.5 (0.0-22.2)	33.0 (13.3-47.9)
Surfactante en cq. momento						
	49.7 (36.7-63.9)	78.3 (100.0-100.0)	86.6 (75.0-100.0)	72.2 (53.8-100.0)	47.4 (33.3-62.5)	27.2 (11.3-47.0)
	N=1220	N=18	N=226	N=405	N=312	N=259
Surfactante en las 6 primeras horas*	89.8 (85.6-100.0)	77.8 (50.0-100.0)	97.3 (100.0-100.0)	93.4 (92.6-100.0)	87.8 (80.0-100.0)	80.9 (75.0-100.0)
Morbilidad						
Distrés respiratorio	52.5 (43.3-68.9)	87.5 (100.0-100.0)	84.6 (75.0-100.0)	71.8 (51.8-100.0)	52.1 (40.0-67.7)	31.8 (17.2-48.5)
Neumotórax	4.8 (0.0-6.7)	12.5 (0.0-25.0)	10.0 (0.0-12.9)	6.7 (0.0-8.9)	3.9 (0.0-4.8)	2.6 (0.0-3.9)
Enfermedad pulmonar crónica						
Oxígeno a los:						
	N=1895	N=10	N=132	N=450	N=591	N=712
28 días	28.8 (18.5-41.2)	77.8 (62.5-100.0)	77.3 (66.7-100.0)	54.5 (35.9-73.5)	22.5 (10.0-44.4)	8.4 (0.0-12.5)
	N=1763	N=7	N=120	N=407	N=501	N=728
36 semanas	13.9 (2.5-21.3)	50.0 (0.0-100.0)	49.1 (0.0-75.0)	27.3 (2.1-41.6)	8.8 (0.0-15.5)	3.7 (0.0-5.9)
Esteroides postnatales	4.8 (0.0-6.7)	8.7 (0.0-0.0)	18.1 (0.0-34.3)	9.4 (0.0-18.2)	1.4 (0.0-0.0)	0.6 (0.0-0.0)
Alta a domicilio						
	N=1960	N=7	N=107	N=400	N=571	N=875
Oxígeno	3.4 (0.0-5.1)	14.3 (0.0-25.0)	17.8 (0.0-33.3)	7.3 (0.0-12.5)	2.3 (0.0-0.0)	0.5 (0.0-0.0)
Monitor	5.7 (0.0-8.0)	-	23.4 (0.0-37.5)	12.6 (0.0-20.0)	3.7 (0.0-6.7)	1.8 (0.0-0.0)

*Porcentaje sobre el total de niños que han recibido surfactante en algún momento

Tabla 3b. Intervenciones respiratorias y morbilidad en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006. % (RIQ)

	Edad gestacional al nacimiento en semanas					
	Total (N=2466)	≤23 (N=36)	24-25 (N=239)	26-27 (N=418)	28-29 (N=610)	≥30 (N=1163)
SopORTE respiratorio						
Oxígeno (sólo)	6.0 (0.0-9.4)	5.6 (0.0-0.0)	0.8 (0.0-0.0)	2.6 (0.0-0.0)	3.1 (0.0-0.0)	9.7 (0.0-16.3)
CPAP (sin ventilación convencional)	20.3 (6.1-29.3)	-	2.5 (0.0-0.0)	8.2 (0.0-12.2)	23.0 (6.9-36.6)	27.7 (8.2-40.3)
Ventilación convencional (Vc)	40.2 (29.2-56.3)	44.4 (0.0-100.0)	53.2 (12.5-88.9)	60.6 (50.0-100.0)	55.5 (33.3-70.8)	21.7 (11.9-37.9)
Ventilación alta frec. (VAFO)	0.3 (0.0-0.0)	-	-	0.2 (0.0-0.0)	0.3 (0.0-0.0)	0.4 (0.0-0.0)
Vc + VAFO	14.6 (0.0-18.4)	44.4 (0.0-68.8)	42.6 (0.0-83.3)	26.8 (0.0-34.1)	12.5 (0.0-18.5)	4.3 (0.0-5.8)
Ninguno	18.3 (6.5-23.3)	5.6 (0.0-0.0)	0.8 (0.0-0.0)	1.4 (0.0-0.0)	5.4 (0.0-6.3)	35.5 (18.2-50.0)
Surfactante en cq. momento						
	49.7 (36.7-63.9)	88.6 (100.0-100.0)	91.2 (87.5-100.0)	82.1 (77.8-100.0)	63.3 (40.7-77.1)	21.3 (10.8-37.5)
	N=1220	N=31	N=217	N=340	N=384	N=248
Surfactante en las 6 primeras horas*	89.8 (85.6-100.0)	96.8 (100.0-100.0)	95.3 (100.0-100.0)	97.6 (100.0-100.0)	87.9 (83.7-100.0)	76.3 (56.8-100.0)
Morbilidad						
Distrés respiratorio	52.5 (43.3-68.9)	85.7 (83.3-100.0)	88.2 (80.0-100.0)	84.9 (78.3-100.0)	64.5 (50.0-78.8)	26.2 (14.5-39.6)
Neumotórax	4.8 (0.0-6.7)	11.1 (0.0-0.0)	11.3 (0.0-16.7)	6.0 (0.0-6.0)	5.3 (0.0-7.4)	2.6 (0.0-3.9)
Enfermedad pulmonar crónica						
Oxígeno a los:						
	N=1895	N=9	N=125	N=319	N=542	N=900
28 días	28.8 (18.5-41.2)	77.8 (25.0-100.0)	87.6 (100.0-100.0)	62.7 (50.0-100.0)	29.9 (14.8-40.2)	7.7 (0.0-14.3)
	N=1763	N=6	N=107	N=254	N=413	N=983
36 semanas	13.9 (2.5-21.3)	100.0 (100.0-100.0)	48.0 (0.0-100.0)	33.5 (0.0-57.1)	12.4 (0.0-17.0)	5.3 (0.0-9.1)
Esteroides postnatales	4.8 (0.0-6.7)	11.4 (0.0-0.0)	17.4 (0.0-33.3)	10.6 (0.0-16.7)	3.0 (0.0-3.9)	0.9 (0.0-0.0)
Alta a domicilio						
	N=1960	N=5	N=103	N=283	N=523	N=1046
Oxígeno	3.4 (0.0-5.1)	20.0 (0.0-50.0)	18.4 (0.0-8.3)	7.8 (0.0-13.3)	2.9 (0.0-0.0)	0.9 (0.0-0.0)
Monitor	5.7 (0.0-8.0)	75.0 (25.0-100.0)	24.3 (0.0-33.3)	15.2 (0.0-29.6)	4.8 (0.0-8.3)	1.5 (0.0-1.3)

*Porcentaje sobre el total de niños que han recibido surfactante en algún momento

Tabla 4a.		<i>Tiempo mediano (RIQ) en minutos hasta la primera dosis de surfactante según lugar de nacimiento y global en recién nacidos con peso < 1500 g. SEN1500, año 2006.</i>								
		INTRAHOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO			TOTAL		
<i>PESO AL NACER (g)</i>		N	Mediana	RIQ	N	Mediana	RIQ	N	Mediana	RIQ
<i>< 501</i>		15	30.0	5.0-30.0	3	15.0	0.0-480.0	18	25.0	5.0-37.5
<i>501-750</i>		211	30.0	20.0-60.0	17	60.0	10.0-90.0	228	30.0	20.0-60.0
<i>751-1000</i>		365	35.0	20.0-87.5	41	60.0	10.5-90.0	406	35.0	20.0-88.5
<i>1001-1250</i>		277	60.0	30.0-136.5	37	60.0	15.0-180.0	314	60.0	30.0-141.0
<i>1251-1500</i>		236	92.5	30.0-283.8	23	60.0	12.0-75.0	259	90.0	30.0-240.0

<i>Edad gestacional (semanas)</i>	INTRAHOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO			TOTAL		
	N	Mediana	RIQ	N	Mediana	RIQ	N	Mediana	RIQ
<24	31	30.0	19.0-60.0	0	0.0	0.0-0.0	31	30.0	19.0-60.0
24-25	193	30.0	20.0-60.0	25	60.0	15.0-105.0	218	30.0	20.0-60.0
26-27	303	30.0	15.0-60.0	39	40.0	10.0-60.0	342	30.0	15.0-60.0
28-29	347	60.0	30.0-125.0	39	60.0	25.0-180.0	386	60.0	30.0-125.0
>=30	230	120.0	30.0-360.0	18	60.0	7.5-145.0	248	115.0	30.0-330.0

Tabla 5a. Situación en la sala de partos, 28 días, 36 semanas postconcepcionales y al alta. Recién nacidos <1500g. SEN1500, año 2006 % (RIQ)

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2504)	< 501 (N=36)	501-750 (N=271)	751-1000 (N=573)	1001-1250 (N=667)	1251-1500 (N=957)
Fallecido en la sala de Partos	1.5 (0.0-0.0)	33.3 (0.0-52.5)	3.7 (0.0-0.0)	1.4 (0.0-0.0)	0.8 (0.0-0.0)	0.2 (0.0-0.0)
Situación a los 28 días						
Unidad Neonatal	75.9 (60.0-80.0)	28.6 (0.0-50.0)	49.3 (24.1-70.1)	78.8 (55.9-92.3)	88.8 (81.3-100.0)	74.4 (60.0-89.7)
Domicilio	7.6 (0.0-9.1)	-	-	0.2 (0.0-0.0)	1.8 (0.0-0.0)	18.6 (0.0-20.9)
Otros hospitales	2.2 (0.0-11.5)	-	-	1.8 (0.0-4.1)	2.2 (0.0-5.9)	3.1 (0.0-7.0)
Fallecido	14.3 (0.0-15.2)	71.4 (0.0-100.0)	50.7 (29.2-75.0)	19.3 (0.0-33.1)	7.2 (0.0-9.7)	3.9 (0.0-5.0)
Desconocido	-	-	-	-	-	-
Situación a los 36 semanas postconcepcionales						
Unidad Neonatal	70.6 (66.7-80.5)	20.0 (0.0-50.0)	44.8 (9.4-62.5)	71.4 (62.1-98.3)	75.3 (70.0-100.0)	76.1 (69.5-93.4)
Domicilio	11.1 (0.0-12.1)	2.9 (0.0-0.0)	-	3.9 (0.0-0.0)	13.8 (0.0-19.4)	16.9 (0.0-19.4)
Otros hospitales	2.9 (0.0-4.7)	-	-	3.7 (0.0-3.4)	3.4 (0.0-2.1)	3.0 (0.0-4.7)
Fallecido	15.3 (5.0-16.1)	77.1 (0.0-100.0)	55.2 (36.5-80.8)	21.1 (0.0-33.3)	7.5 (0.0-9.7)	4.0 (0.0-5.2)
Desconocido	0.3 (0.0-0.0)	2.8 (0.0-0.0)	1.1 (0.0-0.0)	0.5 (0.0-0.0)	-	-
Situación al Alta						
Domicilio	78.5 (60.0-83.3)	20.0 (0.0-23.3)	39.9 (0.0-57.3)	69.9 (50.0-80.0)	85.8 (77.8-100.0)	91.4 (80.6-100.0)
Fallecido	16.7 (5.0-17.3)	80.0 (0.0-100.0)	57.8 (39.4-86.2)	24.1 (0.0-37.3)	8.5 (0.0-9.8)	4.2 (0.0-5.4)
Hospitalizado > de un año	0.0 (0.0-0.0)	-	0.4 (0.0-0.0)	-	-	-
Trasladado	4.8 (0.0-14.5)	-	1.9 (0.0-0.0)	5.9 (0.0-14.9)	5.7 (0.0-11.8)	4.4 (0.0-9.2)
Desconocido	0.2 (0.0-0.0)	2.8 (0.0-0.0)	1.1 (0.0-0.0)	0.2 (0.0-0.0)	-	-
Vivos	83.1 (82.7-95.0)	19.4 (0.0-100.0)	41.7 (13.8-60.0)	75.7 (62.7-100.0)	91.5 (90.2-100.0)	95.8 (94.6-100.0)
Lact. Materna	23.0 (5.6-34.4)	18.2 (0.0-25.0)	26.0 (0.0-45.0)	22.7 (0.0-34.5)	24.9 (0.0-37.5)	21.3 (0.0-33.3)
Lact. Mixta	27.4 (7.7-37.9)	45.5 (0.0-100.0)	17.2 (0.0-33.3)	20.0 (0.0-25.0)	27.4 (5.3-37.8)	32.9 (4.2-47.5)
Lact. Artificial	49.6 (31.7-69.2)	36.4 (0.0-100.0)	56.8 (26.8-100.0)	57.2 (33.3-87.5)	47.7 (33.3-68.8)	45.7 (30.0-77.0)

Tabla 5b. Situación en la sala de partos, 28 días, 36 semanas postconcepcionales y al alta. Recién nacidos <1500g. SEN1500, año 2006 % (RIQ)

	Edad gestacional al nacimiento en semanas					
	Total (N=2504)	≤23 (N=51)	24-25 (N=245)	26-27 (N=423)	28-29 (N=613)	≥30 (N=1172)
Fallecido en la sala de Partos	1.5 (0.0-0.0)	29.4 (0.0-0.0)	2.4 (0.0-0.0)	1.2 (0.0-0.0)	0.3 (0.0-0.0)	0.8 (0.0-0.0)
Situación a los 28 días						
Unidad Neonatal	75.9 (60.0-80.0)	17.6 (0.0-36.3)	51.4 (0.0-66.7)	75.8 (57.4-100.0)	88.7 (80.6-100.0)	76.9 (66.9-90.0)
Domicilio	7.6 (0.0-9.1)	-	-	0.2 (0.0-0.0)	1.5 (0.0-0.0)	15.5 (0.0-18.5)
Otros hospitales	2.2 (0.0-11.5)	-	-	1.9 (0.0-0.0)	1.8 (0.0-5.2)	3.1 (0.0-4.3)
Fallecido	14.3 (0.0-15.2)	82.4 (52.5-100.0)	48.6 (20.0-70.0)	22.1 (0.0-33.3)	8.0 (0.0-11.4)	4.6 (0.0-7.6)
Desconocido	-	-	-	-	-	-
Situación a los 36 semanas postconcepcionales						
Unidad Neonatal	70.6 (66.7-80.5)	11.8 (0.0-10.7)	44.2 (9.1-65.2)	60.3 (50.0-100.0)	67.6 (51.7-86.2)	83.9 (80.0-95.1)
Domicilio	11.1 (0.0-12.1)	3.9 (0.0-0.0)	3.3 (0.0-0.0)	10.2 (0.0-11.0)	20.1 (0.0-31.1)	8.6 (0.0-9.4)
Otros hospitales	2.9 (0.0-4.7)	-	-	4.5 (0.0-0.0)	3.6 (0.0-7.8)	2.7 (0.0-1.4)
Fallecido	15.3 (5.0-16.1)	84.3 (63.8-100.0)	52.5 (21.7-75.0)	24.9 (0.0-36.5)	8.7 (0.0-12.5)	4.7 (0.0-8.0)
Desconocido	0.3 (0.0-0.0)	-	1.2 (0.0-0.0)	0.5 (0.0-0.0)	0.2 (0.0-0.0)	0.1 (0.0-0.0)
Situación al Alta						
Domicilio	78.5 (60.0-83.3)	9.8 (0.0-0.0)	42.4 (0.0-50.0)	67.2 (50.0-80.0)	85.5 (73.0-96.4)	89.3 (82.9-100.0)
Fallecido	16.7 (5.0-17.3)	90.2 (85.0-100.0)	54.7 (21.7-75.0)	26.8 (0.0-37.5)	9.5 (0.0-12.5)	5.8 (0.0-8.1)
Hospitalizado > de un año	0.0 (0.0-0.0)	-	0.4 (0.0-0.0)	-	-	-
Trasladado	4.8 (0.0-14.5)	-	2.5 (0.0-7.7)	5.9 (0.0-10.8)	5.1 (0.0-12.5)	4.9 (0.0-8.3)
Desconocido	0.2 (0.0-0.0)	-	0.8 (0.0-0.0)	0.5 (0.0-0.0)	-	0.1 (0.0-0.0)
Vivos	83.1 (82.7-95.0)	9.8 (0.0-15.0)	44.9 (20.0-78.3)	72.8 (62.5-100.0)	90.5 (87.5-100.0)	94.1 (91.9-100.0)
Lact. Materna	23.0 (5.6-34.4)	10.0 (0.0-0.0)	25.3 (0.0-40.0)	24.2 (0.0-40.0)	23.0 (0.0-39.8)	22.4 (0.0-36.9)
Lact. Mixta	27.4 (7.7-37.9)	10.0 (0.0-0.0)	17.7 (0.0-33.3)	20.7 (0.0-25.0)	26.9 (0.0-38.5)	31.3 (8.3-45.8)
Lact. Artificial	49.6 (31.7-69.2)	80.0 (50.0-100.0)	57.0 (14.3-100.0)	55.0 (40.0-90.5)	50.1 (28.0-74.2)	46.4 (30.0-66.7)

Tabla 6a. Otros resultados e intervenciones en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006. % (RIQ)

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2466)	< 501 (N=24)	501-750 (N=261)	751-1000 (N=565)	1001-1250 (N=661)	1251-1500 (N=955)
Persistencia del conducto arterioso (PCA)*	N=2324	N=19	N=203	N=526	N=640	N=936
	29.4 (15.6-37.5)	47.4 (0.0-100.0)	56.7 (10.7-65.7)	47.4 (23.1-60.0)	28.8 (7.5-38.6)	13.4 (3.5-20.9)
Indometacina^a	N=682	N=9	N=115	N=249	N=184	N=125
	58.3 (9.1-80.0)	33.3 (0.0-100.0)	53.1 (0.0-76.3)	62.1 (0.0-100.0)	62.4 (33.3-100.0)	51.2 (0.0-100.0)
Cierre quirúrgico^a	N=682	N=9	N=115	N=249	N=184	N=125
	15.4 (0.0-20.0)	-	32.2 (0.0-50.0)	19.7 (0.0-33.3)	9.8 (0.0-18.8)	0.8 (0.0-0.0)
Enterocolitis necrotizante*	N=2324	N=19	N=203	N=526	N=640	N=936
	7.7 (0.0-13.2)	15.8 (0.0-25.0)	17.7 (0.0-29.2)	12.6 (0.0-25.0)	7.3 (0.0-16.1)	2.9 (0.0-4.8)
Cirugía^a	N=179	N=3	N=36	N=66	N=47	N=27
	48.0 (0.0-75.0)	66.7 (25.0-100.0)	52.8 (0.0-100.0)	59.1 (25.0-100.0)	40.4 (0.0-90.0)	25.9 (0.0-100.0)
Perforación gastrointestinal	N=179	N=3	N=36	N=66	N=47	N=27
	2.0 (0.0-3.3)	4.2 (0.0-0.0)	4.3 (0.0-0.0)	4.1 (0.0-4.0)	1.4 (0.0-0.0)	0.4 (0.0-0.0)
Infeción						
Precoz	N=2324	N=19	N=203	N=526	N=640	N=936
	3.5 (0.0-5.0)	-	5.1 (0.0-0.0)	3.0 (0.0-0.0)	4.1 (0.0-5.6)	2.9 (0.0-2.9)
Tardía *	N=2324	N=19	N=203	N=526	N=640	N=936
	29.9 (19.1-50.0)	60.0 (50.0-100.0)	55.2 (35.4-95.5)	45.7 (20.0-70.0)	27.4 (13.3-50.0)	17.2 (6.1-33.3)
Staf. coagulasa negativo	N=2324	N=19	N=203	N=526	N=640	N=936
	19.9 (4.7-33.2)	46.2 (0.0-100.0)	35.9 (0.0-64.4)	30.8 (0.0-50.0)	17.5 (0.0-50.0)	11.4 (0.0-15.5)
Hongos	N=2324	N=19	N=203	N=526	N=640	N=936
	4.7 (0.0-7.8)	-	13.5 (0.0-14.3)	8.6 (0.0-16.7)	3.0 (0.0-0.8)	1.8 (0.0-0.0)
Supervivencia sin morbilidad^b	N=2324	N=19	N=203	N=526	N=640	N=936
	50.0 (33.3-59.2)	12.5 (0.0-0.0)	12.6 (0.0-25.0)	30.2 (2.1-50.0)	54.3 (37.5-66.7)	70.7 (50.0-82.6)

^a Porcentaje sobre el total de niños con la patología que tienen el dato correspondiente registrado

^b Sin neumotórax, enterocolitis necrotizante, sepsis tardía, leucomalacia quística, hemorragia intraventricular grados 3 y 4 y displasia broncopulmonar

* La PCA, la enterocolitis y la sepsis tardía están calculadas sobre los niños que han estado ingresados más de 72 horas

Tabla 6b. Otros resultados e intervenciones en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006. % (RIQ)		Edad gestacional al nacimiento en semanas					
	Total (N=2466)	≤23 (N=36)	24-25 (N=239)	26-27 (N=418)	28-29 (N=610)	≥30 (N=1163)	
Persistencia del conducto arterioso (PCA)*	N=2324	N=19	N=190	N=382	N=595	N=1138	
	29.4 (15.6-37.5)	63.2 (0.0-100.0)	71.6 (33.3-75.0)	50.3 (25.0-66.7)	35.2 (14.9-48.5)	11.7 (0.0-16.4)	
	N=682	N=12	N=136	N=192	N=209	N=133	
Indometacina^a	58.3 (9.1-80.0)	58.3 (25.0-100.0)	55.6 (0.0-100.0)	62.8 (7.7-100.0)	62.0 (0.0-100.0)	48.8 (0.0-80.0)	
Cierre quirúrgico^a	15.4 (0.0-20.0)	25.0 (0.0-75.0)	33.8 (0.0-50.0)	17.2 (0.0-29.4)	9.1 (0.0-13.8)	3.0 (0.0-0.0)	
Enterocolitis necrotizante*	N=2324	N=19	N=190	N=382	N=595	N=1138	
	7.7 (0.0-13.2)	21.1 (0.0-6.3)	16.3 (0.0-25.0)	11.3 (0.0-17.4)	8.9 (0.0-17.4)	4.2 (0.0-7.3)	
	N=179	N=4	N=31	N=43	N=53	N=48	
Cirugía^a	48.0 (0.0-75.0)	75.0 (50.0-100.0)	61.3 (0.0-100.0)	60.5 (27.1-100.0)	37.7 (0.0-75.0)	37.5 (0.0-100.0)	
Perforación gastrointestinal	2.0 (0.0-3.3)	5.7 (0.0-0.0)	3.4 (0.0-0.0)	4.8 (0.0-7.9)	1.6 (0.0-0.0)	0.7 (0.0-0.0)	
Infección							
Precoz	3.5 (0.0-5.0)	5.6 (0.0-0.0)	4.7 (0.0-0.0)	3.9 (0.0-2.8)	3.9 (0.0-5.3)	2.8 (0.0-3.6)	
Tardía *	N=2324	N=19	N=190	N=382	N=595	N=1138	
	29.9 (19.1-50.0)	56.3 (0.0-100.0)	61.2 (47.2-100.0)	47.6 (25.5-80.8)	34.3 (18.3-60.0)	16.5 (5.4-28.2)	
Staf. coagulasa negativo	19.9 (4.7-33.2)	28.6 (0.0-100.0)	42.6 (0.0-75.0)	30.8 (0.0-50.0)	22.7 (0.0-50.0)	10.5 (0.0-15.1)	
Hongos	4.7 (0.0-7.8)	21.4 (0.0-37.5)	15.2 (0.0-38.3)	7.1 (0.0-10.0)	4.5 (0.0-0.9)	1.9 (0.0-1.4)	
Supervivencia sin morbilidad^b	50.0 (33.3-59.2)	5.0 (0.0-0.0)	9.2 (0.0-11.1)	20.5 (0.0-36.5)	43.7 (25.0-60.0)	72.1 (57.1-84.0)	

^a Porcentaje sobre el total de niños con la patología que tienen el dato correspondiente registrado

^b Sin neumotórax, enterocolitis necrotizante, sepsis tardía, leucomalacia quística, hemorragia intraventricular grados 3 y 4 y displasia broncopulmonar

* La PCA, la enterocolitis y la sepsis tardía están calculadas sobre los niños que han estado ingresados más de 72 horas

Tabla 7a. Otros resultados e intervenciones en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006 % (RIQ)

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2466)	< 501 (N=24)	501-750 (N=261)	751-1000 (N=565)	1001-1250 (N=661)	1251-1500 (N=955)
Hemorragia intraventricular						
ECO realizada	95.4 (93.5-100.0)	78.3 (50.0-100.0)	88.3 (84.5-100.0)	96.3 (96.6-100.0)	97.1 (100.0-100.0)	96.0 (94.6-100.0)
	N=2339	N=18	N=227	N=539	N=641	N=914
Grado^a						
0	75.8 (66.7-87.9)	66.7 (0.0-100.0)	49.8 (33.3-66.7)	63.3 (50.0-75.0)	76.3 (61.2-100.0)	89.5 (85.7-100.0)
1	9.4 (0.0-10.0)	5.6 (0.0-0.0)	11.0 (0.0-16.7)	10.4 (0.0-11.1)	12.3 (0.0-20.8)	6.3 (0.0-7.1)
2	5.8 (0.0-6.7)	5.6 (0.0-0.0)	13.7 (0.0-19.4)	11.5 (0.0-21.7)	4.1 (0.0-4.1)	1.8 (0.0-0.0)
3	3.7 (0.0-6.7)	5.6 (0.0-0.0)	12.8 (0.0-23.2)	4.3 (0.0-5.8)	3.6 (0.0-2.4)	1.2 (0.0-0.0)
4	5.3 (0.0-6.7)	16.7 (0.0-8.3)	12.8 (0.0-21.1)	10.6 (0.0-16.7)	3.7 (0.0-5.1)	1.2 (0.0-0.0)
Leucomalacia perivent. quística^a	1.9 (0.0-3.1)	11.1 (0.0-0.0)	1.8 (0.0-0.0)	3.0 (0.0-2.9)	2.0 (0.0-0.0)	0.9 (0.0-0.0)
Retinopatía del prematuro						
Fondo de ojo realizado	69.9 (66.2-84.8)	37.5 (0.0-75.0)	47.5 (20.4-62.5)	73.6 (58.8-98.6)	80.4 (80.7-100.0)	67.1 (56.3-89.2)
	N=1672	N=9	N=116	N=402	N=518	N=627
Grado^a						
0	77.3 (66.7-96.4)	55.6 (0.0-100.0)	40.5 (0.0-66.7)	59.7 (40.6-100.0)	81.0 (70.0-100.0)	92.5 (90.5-100.0)
1	11.0 (0.0-13.0)	11.1 (0.0-0.0)	16.4 (0.0-25.0)	15.7 (0.0-21.0)	12.2 (0.0-20.0)	5.9 (0.0-6.8)
2	7.0 (0.0-11.1)	-	20.7 (0.0-33.3)	13.9 (0.0-24.8)	5.6 (0.0-9.1)	1.3 (0.0-0.0)
3	4.6 (0.0-6.3)	33.3 (0.0-100.0)	22.4 (0.0-42.9)	10.0 (0.0-15.6)	1.2 (0.0-0.0)	0.3 (0.0-0.0)
4	0.1 (0.0-0.0)	-	-	0.5 (0.0-0.0)	-	-
5	0.1 (0.0-0.0)	-	-	0.2 (0.0-0.0)	-	-
Cirugía^a	4.4 (0.0-5.6)	33.3 (0.0-100.0)	21.6 (0.0-40.0)	8.7 (0.0-10.8)	1.7 (0.0-0.0)	0.3 (0.0-0.0)

^a Porcentaje sobre el total de niños con prueba realizada que tienen el dato correspondiente registrado

Tabla 7b. Otros resultados e intervenciones en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006 % (RIQ)

	Edad gestacional al nacimiento en semanas					
	Total (N=2466)	≤23 (N=36)	24-25 (N=239)	26-27 (N=418)	28-29 (N=610)	≥30 (N=1163)
Hemorragia intraventricular						
ECO realizada	95.4 (93.5-100.0)	68.6 (25.0-100.0)	88.5 (83.3-100.0)	96.2 (100.0-100.0)	98.2 (100.0-100.0)	95.9 (94.4-100.0)
	N=2339	N=24	N=208	N=400	N=594	N=1113
Grado^a						
0	75.8 (66.7-87.9)	41.7 (0.0-100.0)	43.3 (0.0-66.7)	56.8 (40.0-75.0)	74.4 (64.4-98.5)	90.2 (85.7-100.0)
1	9.4 (0.0-10.0)	-	12.0 (0.0-25.0)	12.0 (0.0-16.7)	12.3 (0.0-16.7)	6.6 (0.0-9.6)
2	5.8 (0.0-6.7)	25.0 (0.0-87.5)	16.3 (0.0-25.0)	11.8 (0.0-16.7)	5.4 (0.0-8.3)	1.5 (0.0-0.4)
3	3.7 (0.0-6.7)	20.8 (0.0-37.5)	11.1 (0.0-20.0)	6.8 (0.0-10.8)	3.9 (0.0-5.5)	0.8 (0.0-0.0)
4	5.3 (0.0-6.7)	12.5 (0.0-0.0)	17.3 (0.0-25.0)	12.8 (0.0-20.0)	4.0 (0.0-5.1)	0.9 (0.0-0.0)
Leucomalacia perivent. quística^a	1.9 (0.0-3.1)	4.2 (0.0-0.0)	3.5 (0.0-0.0)	3.3 (0.0-2.8)	2.7 (0.0-0.0)	0.5 (0.0-0.0)
Retinopatía del prematuro						
Fondo de ojo realizado	69.9 (66.2-84.8)	20.6 (0.0-37.5)	50.7 (19.2-77.9)	71.6 (60.0-100.0)	81.6 (80.0-100.0)	68.4 (61.3-91.9)
	N=1672	N=7	N=114	N=283	N=487	N=781
Grado^a						
0	77.3 (66.7-96.4)	28.6 (0.0-100.0)	32.5 (0.0-68.6)	59.0 (33.3-94.2)	76.4 (66.7-100.0)	91.4 (88.9-100.0)
1	11.0 (0.0-13.0)	-	14.0 (0.0-18.3)	15.9 (0.0-20.4)	15.0 (0.0-17.4)	6.3 (0.0-8.2)
2	7.0 (0.0-11.1)	42.9 (0.0-100.0)	19.3 (0.0-33.3)	16.3 (0.0-30.8)	6.4 (0.0-7.9)	1.9 (0.0-0.0)
3	4.6 (0.0-6.3)	28.6 (0.0-100.0)	33.3 (0.0-55.0)	8.1 (0.0-11.1)	2.3 (0.0-0.0)	0.4 (0.0-0.0)
4	0.1 (0.0-0.0)	-	-	0.7 (0.0-0.0)	-	-
5	0.1 (0.0-0.0)	-	0.9 (0.0-0.0)	-	-	-
Cirugía^a	4.4 (0.0-5.6)	14.3 (0.0-25.0)	30.7 (0.0-58.3)	8.5 (0.0-5.0)	2.3 (0.0-0.0)	0.4 (0.0-0.0)

^a Porcentaje sobre el total de niños con prueba realizada que tienen el dato correspondiente registrado

Tabla 8a. Duración de la estancia media en días (DE) en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.		Peso al nacimiento en gramos				
		Total (N=2466)	< 501 (N=24)	501-750 (N=261)	751-1000 (N=565)	1001-1250 (N=661)
Alta domiciliaria	57.5 (34.6)	78.6 (36.2)	111.0 (38.9)	81.6 (36.5)	56.4 (25.5)	40.6 (23.4)
Fallecimiento	18.4 (37.6)	14.0 (22.9)	15.4 (29.8)	21.5 (35.3)	17.5 (29.3)	22.6 (72.1)
Hospitalizado al año	286.0 (0.0)	0.0 (0.0)	286.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
Traslado	38.0 (35.1)	0.0 (0.0)	126.2 (53.1)	48.7 (35.6)	32.3 (20.5)	23.8 (23.9)
Total	50.6 (38.2)	33.7 (40.5)	58.2 (60.5)	65.8 (44.2)	52.0 (28.0)	39.1 (27.4)

Tabla 8b. Duración de la estancia media en días (DE) en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.		Peso al nacimiento en gramos				
		Total (N=2466)	<24 (N=36)	24-25 (N=239)	26-27 (N=418)	28-29 (N=610)
Alta domiciliaria	57.5 (34.6)	95.6 (29.7)	109.9 (36.2)	83.9 (38.5)	61.6 (23.8)	43.0 (27.2)
Fallecimiento	18.4 (37.6)	13.8 (29.3)	13.4 (25.0)	18.3 (31.4)	18.3 (29.5)	31.9 (67.5)
Hospitalizado al año	286.0 (0.0)	0.0 (0.0)	286.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
Traslado	38.0 (35.1)	0.0 (0.0)	99.3 (32.2)	50.9 (45.5)	37.4 (28.7)	26.2 (23.3)
Total	50.6 (38.2)	25.2 (40.7)	58.7 (58.6)	64.9 (47.0)	56.4 (27.9)	41.6 (30.6)

Tabla 9a. Duración de la estancia mediana en días (RIQ) en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2466)	< 501 (N=24)	501-750 (N=261)	751-1000 (N=565)	1001-1250 (N=661)	1251-1500 (N=955)
Alta domiciliaria	50.0 (37.0-68.0)	65.0 (57.0-101.0)	104.0 (90.0-126.0)	74.0 (62.0-94.0)	53.0 (44.0-63.0)	38.0 (30.0-47.0)
Fallecimiento	5.0 (1.0-17.0)	3.5 (1.5-13.2)	4.0 (1.0-16.0)	8.5 (2.0-20.5)	6.5 (1.2-19.2)	4.0 (1.0-11.2)
Hospitalizado al año	286.0 (286.0-286.0)	0.0 (0.0-0.0)	286.0 (286.0-286.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)
Traslado	29.5 (13.8-49.0)	0.0 (0.0-0.0)	105.0 (83.5-179.5)	44.5 (19.8-66.2)	33.0 (18.0-44.0)	17.0 (10.0-29.2)
Total	45.0 (30.0-64.0)	11.0 (3.0-58.0)	34.0 (3.0-103.2)	66.0 (42.0-87.0)	51.0 (40.0-62.0)	37.0 (28.0-47.0)

Tabla 9b. Duración de la estancia mediana en días (RIQ) en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2466)	<24 (N=36)	24-25 (N=239)	26-27 (N=418)	28-29 (N=610)	>=30 (N=1163)
<i>Alta domiciliaria</i>	50.0 (37.0-68.0)	100.0 (66.0-123.0)	104.0 (90.0-124.0)	79.0 (63.0-95.0)	57.0 (48.0-69.0)	39.0 (31.0-49.0)
<i>Fallecimiento</i>	5.0 (1.0-17.0)	1.0 (1.0-10.0)	4.0 (1.0-15.0)	6.0 (2.0-18.5)	9.0 (2.0-17.8)	6.0 (1.0-28.0)
<i>Hospitalizado al año</i>	286.0 (286.0-286.0)	0.0 (0.0-0.0)	286.0 (286.0-286.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)
<i>Traslado</i>	30.0 (14.0-49.0)	0.0 (0.0-0.0)	89.5 (74.0-124.8)	44.0 (21.5-62.0)	34.0 (19.0-45.0)	23.0 (10.0-34.5)
Total	45.0 (30.0-64.0)	3.0 (1.0-39.2)	40.0 (3.5-104.0)	66.0 (34.0-89.8)	55.0 (44.0-67.0)	38.0 (29.0-49.0)

Tabla 10a. Peso medio en gramos (DE) al alta en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2504)	< 501 (N=36)	501-750 (N=271)	751-1000 (N=573)	1001-1250 (N=667)	1251-1500 (N=957)
<i>Alta domiciliaria</i>	2328.5 (496.7)	2135.7 (260.9)	2689.8 (864.5)	2443.9 (638.3)	2305.6 (441.7)	2247.8 (345.2)
<i>Fallecimiento</i>	1001.5 (524.0)	500.4 (150.9)	773.9 (399.1)	1130.0 (616.4)	1275.8 (395.2)	1386.8 (154.1)
<i>Hospitalizado al año</i>	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
<i>Traslado</i>	1695.3 (566.3)	0.0 (0.0)	2784.0 (1049.5)	1634.8 (648.8)	1591.4 (356.0)	1708.7 (452.2)

Tabla 10b. Peso medio en gramos (DE) al alta en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2504)	<24 (N=51)	24-25 (N=245)	26-27 (N=423)	28-29 (N=613)	>=30 (N=1172)
<i>Alta domiciliaria</i>	2328.5 (496.7)	2359.0 (285.8)	2781.4 (848.9)	2553.9 (694.8)	2363.5 (447.8)	2205.1 (333.7)
<i>Fallecimiento</i>	1001.5 (524.0)	682.4 (372.3)	805.2 (398.8)	1058.0 (492.9)	1213.7 (524.3)	1324.0 (603.2)
<i>Hospitalizado al año</i>	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
<i>Traslado</i>	1695.3 (566.3)	0.0 (0.0)	2494.2 (837.7)	1632.2 (671.8)	1704.1 (553.9)	1634.1 (425.8)

Tabla 11a. Peso mediano en gramos (RIQ) al alta en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2504)	< 501 (N=36)	501-750 (N=271)	751-1000 (N=573)	1001-1250 (N=667)	1251-1500 (N=957)
Alta domiciliaria	2230.0 (2050.0-2450.0)	2080.0 (1935.0-2460.0)	2480.0 (2185.0-2835.0)	2300.0 (2071.2-2603.8)	2217.5 (2055.0-2420.0)	2200.0 (2025.0-2380.0)
Fallecimiento	880.0 (655.0-1168.0)	480.0 (430.0-500.0)	670.0 (591.2-780.0)	920.0 (820.0-1107.5)	1150.0 (1020.0-1328.0)	1390.0 (1300.0-1430.0)
Hospitalizado al año	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)
Traslado	1640.0 (1365.0-1890.0)	0.0 (0.0-0.0)	2545.0 (1905.0-3782.5)	1662.5 (1106.2-1958.8)	1620.0 (1278.2-1765.0)	1572.5 (1400.0-1830.0)

Tabla 11b. Peso mediano en gramos (RIQ) al alta en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.

	Peso al nacimiento en gramos					
	Total (N=2504)	<24 (N=51)	24-25 (N=245)	26-27 (N=423)	28-29 (N=613)	>=30 (N=1172)
<i>Alta domiciliaria</i>	2230.0 (2050.0-2450.0)	2400.0 (2090.0-2607.5)	2560.0 (2310.0-3160.0)	2390.0 (2150.0-2770.0)	2277.5 (2088.8-2500.0)	2155.0 (2000.0-2320.0)
<i>Fallecimiento</i>	880.0 (655.0-1168.0)	590.0 (505.0-680.0)	730.0 (600.0-860.0)	970.0 (780.0-1100.0)	1202.0 (902.5-1407.5)	1265.0 (1000.0-1415.0)
<i>Hospitalizado al año</i>	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)	0.0 (0.0-0.0)
<i>Traslado</i>	1640.0 (1365.0-1890.0)	0.0 (0.0-0.0)	2380.0 (1952.5-3193.8)	1620.0 (1160.0-1872.5)	1710.0 (1400.0-1950.0)	1565.0 (1370.0-1785.0)

Tabla 12a. Fallecimientos en recién nacidos con peso < 1500g, por intervalos de peso (100g). SEN1500, año 2006.

Peso (g)	N	Totales		Sala de partos		Unidad Neonatal	
		N	%	N	%	N	%*
401 - 500	29	23	82.1	8	27.6	15	75.0
501 - 600	77	53	68.8	5	6.5	48	66.7
601 - 700	128	71	55.5	4	3.1	67	54.0
701 - 800	170	64	38.3	3	1.8	61	37.2
801 - 900	214	55	25.7	3	1.4	52	24.6
901 - 1000	255	50	19.7	3	1.2	47	18.7
1001 - 1100	243	29	11.9	3	1.2	26	10.8
1101 - 1200	285	23	8.0	2	0.7	21	7.4
1201 - 1300	300	16	5.3	0	-	16	5.3
1301 - 1400	357	15	4.2	1	0.3	14	3.9
1401 - 1499	406	13	3.2	1	0.2	12	3.0

* Porcentaje sobre el total de niños ingresados en la Unidad Neonatal

Tabla 12b. Fallecimientos en recién nacidos con peso < 1500g, por intervalos de edad gestacional (semanas). SEN1500, año 2006.

Edad gestacional (semanas)	N	Totales		Sala de partos		Unidad Neonatal	
		N	%	N	%	N	%*
<24	51	46	90.2	15	29.4	31	86.1
24	112	69	62.2	4	3.6	65	60.7
25	133	64	48.5	2	1.5	62	47.7
26	188	69	37.1	1	0.5	68	36.8
27	235	44	18.7	4	1.7	40	17.3
28	295	38	12.8	2	0.7	36	12.3
29	317	20	6.3	0	-	20	6.3
30	339	21	6.2	4	1.2	17	5.1
31	256	15	5.9	1	0.4	14	5.5
32	213	14	6.6	2	0.9	12	5.7
33	170	6	3.5	0	-	6	3.5
34	108	6	5.6	1	0.9	5	4.7
35	53	5	9.4	1	1.9	4	7.7
36	24	0	-	0	-	0	-
≥37	9	1	11.1	0	-	1	11.1

* Porcentaje sobre el total de niños ingresados en la Unidad Neonatal

Tabla 13. Morbilidad en recién nacidos con peso < 1500g. SEN1500, año 2006.

Peso (g)	N	Enfermedad de la membrana hialina				Neumotórax		Hemorragia intraventricular grave		Enterocolitis necrotizante	
		N	%	N	%	N	%	N	%		
401 - 500	21	18	85.7	2	9.5	4	26.7	2	9.5		
501 - 600	72	57	80.3	10	13.9	13	22.4	12	17.1		
601 - 700	124	109	87.9	9	7.3	37	32.7	16	12.9		
701 - 800	167	136	82.4	16	9.6	28	18.7	21	12.6		
801 - 900	211	151	71.9	14	6.7	32	16.0	23	11.0		
901 - 1000	252	170	67.5	15	6.0	28	11.4	31	12.3		
1001 - 1100	240	141	59.0	9	3.8	22	9.4	19	7.9		
1101 - 1200	283	143	50.5	11	3.9	17	6.2	22	7.8		
1201 - 1300	300	125	41.8	8	2.7	16	5.5	11	3.7		
1301 - 1400	356	125	35.1	12	3.4	10	2.9	10	2.8		
1401 - 1499	405	106	26.2	11	2.7	4	1.0	11	2.7		